



Prebrojavanje gnijezdećih kolonija vrane gačac (*Corvus frugilegus*)

Gačac (*Corvus frugilegus*) je ptica iz porodice vrana (Corvidae). Perje gačca je u potpunosti sjajno crno, dok je kljun pri bazi istaknute svijetlo sive boje. Gnijezdi se u kolonijama koje se uglavnom nalaze u gradskim parkovima ili drvoredima, a ponekad u šumarcima ili drvoredima izvan naselja. Gniježđenje započinje već u ožujku, prije nego drveće prolista. Gnijezda gradi isključivo na listopadnim stablima. Vrsta je rasprostranjena samo u kontinentalnom dijelu Hrvatske.



Prebrojavanje se obavlja **u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja**, budući da su stabla tada još uvijek bez lišća te se sva gnijezda dobro vide. Kolonije je obično lako uočiti jer su gnijezda velika (u prosjeku 40 cm široka i 30 cm visoka) i smještena na gornjim granama visokog drveća, a gačci su vrlo glasne ptice koje bukom privlače pozornost na sebe. Nakon lociranja kolonije, potrebno utvrditi koliko u koloniji ima aktivnih gnijezda. **Aktivno gnijezdo je lako prepoznati jer je veliko i dobro izgrađeno, loptastog oblika te je gotovo uvijek barem jedan gačac prisutan na njemu ili ga nadograđuje.** Neaktivna gnijezda su mala i u raspadajućem stanju te na njih ne slijeću ptice. Potrebno je zabilježiti i vrstu stabala na kojima se nalaze gnijezda te po mogućnosti broj stabala s gnijezdima.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko- srijemske županije ove godine zabilježila je 279 aktivnih gnijezda u parku Lenije.