



DABAR (*Castor fiber L.*)



Dabar je biljojed koji živi na vodotocima i vodenim površinama. Hrani se zeljastim i drvenastim biljnim vrstama. Najomiljenije mu je sočno zeljasto bilje koje se nalazi u vodi ili neposredno na obali.

U Hrvatskoj je prisutna vrsta *Castor fiber L.* koja prema kriterijima IUCN-a svrstana u kategoriju VU (rizična vrsta).

Budući da ima snažne čeljusti i oštre zube glodnjake koji su poput dlijeta, lako podgriza i ruši stabla, što ne može ni jedna druga životinjska vrsta. Zahvaljujući dobro razvijenim osjetilima i inteligenciji rijetko dolazi u neprilike. Obara stabla između 8 i 20 cm promjera, a ponekad i do 60cm i to tipičnim odgrizanjem na visini do 40 cm iznad tla. Mlade izbojke i koru dabar koristi za prehranu dok ostatak drvnog materijala koristi za izgradnju brana i nastambi. Zahvaljujući prilično dugom životnom vijeku, dobroj reprodukciji i malom broju prirodnih neprijatelja, dabrovi dosta brzo povećavaju brojno stanje i šire se na nova područja.

U 18. i 19.stoljeću bilježi se intenzivno nestajanje dabra. Zalaganjem pojedinaca i skupina do danas je dabar vraćen u većinu nekadašnjih autohtonih staništa. Populacije dobro napreduju uz potreban monitoring i suradnju s lokalnim stanovništvom.

Prema procjenama brojnog stanja dabrova u Hrvatskoj, populacija dabra se svake 4-5 godina udvostruči. Jedan od sigurnih znakova da je dabar na nekom području su njihove nastambe, koje mogu biti humke ili jame. Obično humci ili jame imaju najmanje dva, a nekada 4-5 ulaza ispod vode te im je gornja prostorija 20-tak cm iznad vode.

Populacije dabrova potrebno je kontinuirano nadzirati i pratiti.